

Sevimsiz yan etkiler

Aşıdan bir süre sonra, deride iğne yapılan yerde kızılık ve ağrı ortaya çıkabilir, ayrıca zaman zaman baş ağrısı ya da ateş de görülebilir. Kalıcı zararlı etkiler gözlenmemiştir.

Aşı nerelerde yaptırılabilir?

Rahim ağzı kanserine karşı aşı programının örgütlenmesi Kantonlara verilmiştir. Doktorunuzdan bu konuda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.



Rahim ağzı kanserine yakalanmak istemiyorum, öyleyse aşı yaptıracağım. Ayrıca bu fırsattan yararlanarak, başka aşılar ihtiyacım olup olmadığını da kontrol ettirmek istiyorum.

Aşıdan sonra, deride yer yer kızılık oluşabilir, ağrı ya da ateş görülebilir. Ama bu yan etkiler hızla ortadan kalkar. Kesin olan bir şey var: Aşının rizikoları, kansere yakalanma riski olduğundan çok daha küçüktür.



Ek bilgiler:

Aşı konusunda daha fazla bilgiye aşağıdaki internet sayfalarından ulaşabilirsiniz:

www.bag.admin.ch

www.infovac.ch

www.sichimpfen.ch

www.tschau.ch

Publication details

© Federal Office of Public Health (FOPH)
Edited by: Federal Office of Public Health (FOPH)
Date of publication: July 2008

This publication is also available in German, French and Italian.

Source of supply: BBL, Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern
www.bundespublikationen.admin.ch

BBL-Article number: 311.360.tur
BAG publication number: BAG OeG 60'000 d 30'000 f 10'000 i 20EXT0805
BAG publication number: BAG OeG 15'000 eng 15'000 esp 15'000 por
15'000 tur 15'000 skb 15'000 alb 20EXT0814

Printed on chlorine-free paper.

Rahim ağzı kanserine karşı aşı

Bütün genç kızlar için!



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Federal Department of Home Affairs FDHA
Federal Office of Public Health FOPH

Önemli olgular

- Rahim ağzı kanserine yol açan virüs Papilloma-virüsüdür.
- Bu virüs, her 100 kişiden 70'ine, yaşamının bir anında bulaşmaktadır.
- Virüsün belirli bir tipinin bulaştığı her beş kadından birinde, kanser başlangıcı ya da kanser hastalığı ortaya çıkar.
- Aşı, bu kanser hastalığının pek çok çeşidine karşı güvenli bir koruma sağlar.
- Kız çocuklarına 11 yaşından başlayarak aşı yapılması tavsiye olunur.
- Aşı koldan enjekte edilir ve tam etki yapabilmesi için iki kez uygulanması gerekir.
- Kız çocukları için aşı giderleri, sigorta (Krankenkasse) tarafından ödenmektedir.



Aşı yaptırmak için inandırıcı nedenler

Papilloma-virüsünün yüzlerce çeşidi vardır. Deride ya da cinsel organlarda yerleşir. Cinsel ilişki yoluyla, hiç farkına varılmadan çok kolay bulaşır. Papilloma-virüsünün belirli tipleri rahim ağzı kanserine yol açar.

Rahim ağzı kanseri, uzun süre hiçbir belirti göstermeden ağır ağır gelişen bir hastalıktır. Kadın hastalıkları uzmanlarınca düzenli aralıklarla yapılan kontroller sayesinde, kanser başlangıç aşamasında teşhis ve tedavi edilebilmektedir. Yine de tedavinin yüzde yüz garantili olduğu söylenemez. Aşı, rahim ağzı kanserine yol açan virüslerin pek çok çeşidine karşı etkili ve güvenli bir koruma sağlamaktadır.

Aşı yapıldıktan sonra bile, kadın doktorlarına gidip kontrolden geçmeyi ihmal etmemek gerekir, çünkü aşı, kansere yol açan bütün virüslere karşı etkin değildir.

Prezervatifler (kaput), cinsel ilişki yoluyla da bulaşan aids gibi hastalıklara karşı korumada vazgeçilmezdir, ama Papilloma-virüslerine karşı ancak kısmi olarak koruyucudur.

Aşı, altı ay içerisinde enjekte edilecek üç dozdan oluşur. Aşının gerçekten koruyucu olabilmesi için, virüsün henüz bulaşmamış olması gerekir, yani aşı ilk cinsel ilişkiden önce yapılmalıdır.

Aşı 11-14 yaş arasındaki bütün kız çocukları için tavsiye olunur. 15-19 yaş arasındaki genç kızlar için de çoğu zaman yararlıdır.

20 yaşından büyük genç kadınlar için aşının anlamlı olup olmayacağı, kişiden kişiye değişir; en iyisi bu konuyu doktorunuzla konuşmaktır.

Erkek çocuklar için ne söylenebilir?

Papilloma-virüsleri erkeklere de bulaşır ve cinsel ilişkiye girdiklerinde onlar da virüsü başkalarına aktarırlar, ama yine de bu aşı erkekler için tavsiye edilmez. Aşının erkeklerde koruyucu olduğu kanıtlanmamıştır.

